

Coronavirus COVID-19

ANNEXE 7 : PALIERS D'INTERVENTION POUR RALENTIR LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 : ADAPTATION DE LA PRATIQUE DENTAIRE

Tableau 1 : Résumé des adaptations de la pratique dentaire en fonction du palier d'intervention

Paliers d'intervention	Asymptomatique/rétabli				
	Palier 1	Palier 2	Palier 3	Palier 4	
	Tous les types d'interventions	Tous les types d'interventions	Tous les types d'interventions	Intervention sans production d'aérosols ou à faible production d'aérosols provenant de liquides biologiques	Intervention à risque de production d'aérosols provenant de liquides biologiques
Mesures de protection associées à la COVID-19	Respecter de l'ensemble des mesures de protection dans la salle opératoire et hors salle opératoire ¹⁹ .	Augmenter la surveillance de l'application stricte de l'ensemble des mesures de protection.	Préparer la clinique au passage possible vers le palier 4	Diminuer le volume de patients qui fréquentent la clinique pour réduire le nombre de personnes qui ont à circuler en société.	
Masque	Masque de procédure (ou chirurgical) minimum niveau 2.			Masque N95 certifié avec test d'étanchéité ou alternative acceptable selon Santé Canada.	
Protection oculaire	Lunettes de protection avec protections latérales ou visière.			Lunettes de protection avec protections latérales ou visière. Prophylaxie dentaire : visière.	Visière
Uniforme	Uniforme de travail.			Uniforme de travail. Prophylaxie dentaire : blouse à manches longues (une par patient)	Blouse à manches longues, jetable ou lavable, non stérile (une par patient). Les gants doivent recouvrir les poignets de la blouse.
Gants	Gants non stériles, à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets				
Ventilation/filtration et salles	<ul style="list-style-type: none"> Salle ouverte ou fermée. Taux d'élimination de 90 % d'efficacité suivant le temps d'attente si intervention à risque de production d'aérosols provenant de liquides biologiques. 			<ul style="list-style-type: none"> Salle ouverte ou fermée. 	<ul style="list-style-type: none"> Salle fermée. Taux d'élimination de 99 % d'efficacité suivant le temps d'attente avant d'entrer dans la pièce sans l'EPI requis.

¹⁹ Par exemple, s'assurer que les actions suivantes soient posées : questionnaire de triage, distanciation physique, désinfection des aires communes, port du masque chez le patient et le personnel en période de repos, etc.

Tableau 1 : Résumé des adaptations de la pratique dentaire en fonction du palier d'intervention

Statut du patient		Asymptomatique/rétabli	
Entretien des lignes d'eau et suctions après chaque intervention	Faire boire les suctions lentes et rapides par intermittence (de façon à créer un tourbillon) en utilisant 100 ml d'eau tiède après chaque intervention.		Faire boire les suctions lentes et rapides par intermittence (de façon à créer un tourbillon) en utilisant 100 ml de solution nettoyante ou désinfectante appropriée après chaque intervention.
Décontamination et stérilisation des instruments	Étape de prétrempage n'est pas nécessaire.		Étape de prétrempage des instruments dans une solution désinfectante.
Statut du patient		Suspecté / confirmé	
Prise en charge		<ol style="list-style-type: none"> 1. Privilégier la télédentisterie lorsque possible; 2. Référer dans une clinique dentaire COVID-19; 3. Traiter en clinique dentaire selon les recommandations de ce document. 	