

TROUSSE D'URGENCE DE BASE

EN CABINET DENTAIRE

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL		INDICATIONS	
Défibrillateur externe automatisé (DEA)		Arrêt cardiaque	
Oxygène – Cylindre de type E ■ 2 masques : 1 pour adulte et 1 pour enfant		Asthme Choc anaphylactique Surdose d'anesthésie locale Syncope vasovagale Douleurs thoraciques (selon le taux de saturation O ₂) – saturomètre	
Saturomètre		Administration d'oxygène	
Glucomètre		Hypoglycémie	
Seringues 1 ml et 3 ml avec aiguilles, jauge 20 à 25 (pour ampoules)			
Tensiomètre ou stéthoscope et sphygmomanomètre			
Thermomètre			
2 masques RCR: 1 pour adulte et 1 pour enfant*			
MÉDICAMENTS		INDICATIONS	
	POSOLOGIE		
	Adulte >25 kg	Enfant < 25 kg	
EpiPen – 2 auto-injecteurs: 1 pour adulte et 1 pour enfant	0,3 mg Répéter si requis	0,15 mg Répéter si requis	Bronchospasme Choc anaphylactique Urticaire grave
Épinéphrine 1:1000 – 2 ampoules de 1 ml pour injection IM	0,3 ml Répéter si requis	0,15 ml Répéter si requis	
Diphénhydramine (Benadryl) ■ Sirop	25 à 50 mg	2,5 à 20 ml	Réactions allergiques ■ Urticaire ■ Œdème laryngé ■ Choc anaphylactique
■ Comprimés de 50 mg			
■ Ampoule de 1 ml de 50 mg/ml pour injection IM			
Nitroglycérine – vaporisateur 0,4 mg ou comprimés sublinguaux de 0,4 mg			Angine
Salbutamol (Ventolin) – inhalateur bronchodilatateur (100 µg/inhalation)	2 à 3 inhalations	1 inhalation	Asthme/bronchospasme
Glucose – comprimés/gel (Insta-Glucose)			Choc hypoglycémique
Aspirine non enrobée – comprimés à croquer de 80 mg	2 à 4 comprimés		Douleurs thoraciques présentant des symptômes de crise cardiaque – angine